

Newcastleská choroba drůbeže

Newcastleská choroba, známá také jako pseudomor drůbeže, je virové onemocnění postihující především hrabavou drůbež. Nejčastěji bývá postižen kur domácí, ale onemocnět mohou i krůty, pávi, bažanti, perličky, holubi, křepelky, koroptve. Kachny a husy jsou rovněž vnímavé, avšak onemocnění u těchto druhů se objevuje zřídka. Vnímaví jsou i pštrosi a mnoho druhů volně žijících ptáků. Onemocnění má podobné příznaky jako ptačí chřipka a projevuje se gastrointestinálními, respiračními a nervovými příznaky, způsobuje ztráty produkce a může vést k hromadným úhynům. V některých případech dochází pouze ke zvýšeným úhynům bez zjevných klinických příznaků. Vakcinace je povinná pouze v reprodukčních chovech kura domácího a v chovech nosnic s produkcí konzumních vajec s více než 500 kusy nosnic na hospodářství, avšak vzhledem k závažnosti této nákazy, doporučujeme všem chovatelům ptáků zvážit vakcinaci svých zvířat nebo nakupovat drůbež již vakcinovanou od prověřených dodavatelů. Vakcinace je účinným nástrojem prevence, který pomáhá chránit zdraví ptáků a zároveň snižuje riziko šíření nákazy. Na trhu jsou dostupné jak živé, tak inaktivované vakcíny. Výběr vhodného typu vakcíny závisí na druhu chovu, věku ptáků a dalších faktorech. Newcastleská choroba je také zoonóza, i když jen mírně nebezpečná pro člověka.

K přenosu těchto nákaz dochází přímým kontaktem s infikovanými ptáky nebo nepřímo prostřednictvím kontaminovaného krmiva, vody, pomůcek či obuvi. S ohledem na hrozící nebezpečí zavlečení této nákazy v rizikových obdobích (jarní a podzimní migrace volně žijících ptáků) na naše území výrazně doporučujeme chovatelům drůbeže, která má přístup do venkovních výběhů, důsledném dodržování preventivních opatření, kterými jsou:

- zamezit kontaktu chované drůbeže s volně žijícími ptáky použitím ochranných sítí proti volně žijícímu ptactvu, plašičů nebo odpuzovačů;
- krmivo a vodu umístit do budov nebo pod přístřešky;
- pravidelně čistit a dezinfikovat kurník a výběh, provádět deratizaci;
- pokud možno nenapájet neošetřenou vodou z povrchových vodních nádrží;
- ke kterým mají přístup volně žijící ptáci
- oddělit chov hrabavé a vodní drůbeže;
- dodržovat osobní hygienu, převlékání, přezouvání a mytí rukou;
- naskladňovat drůbež nejlépe současně;
- vakcinovat proti newcastleské chorobě nebo nakupovat již vakcinovanou drůbež od prověřených dodavatelů.

V případě zvýšených úhynů, změn ve zdravotním stavu nebo produkci vajec, je nutné neprodleně informovat místně příslušnou krajskou veterinární správu. Dále bychom Vás chtěli informovat, abyste v případě nálezu uhynulých volně žijících ptáků ve Vaší obci nebo v její blízkosti rovněž informovali místně příslušnou krajskou veterinární správu. Kontakty na jednotlivá regionální pracoviště naleznete na webových stránkách Státní veterinární správy (www.svscr.cz): [Organizační útvary Státní veterinární správy – Státní veterinární správa](#) .

Další informace naleznete na webových stránkách Státní veterinární správy [Ptačí chřipka – aviární influenza – Státní veterinární správa](#) , [Newcastleská choroba – Státní veterinární správa](#) a [Ptačí chřipka u volně žijících ptáků – Státní veterinární správa](#) .